



**EL COBRE QUE  
LE OFRECE  
LA CALIDAD  
Y EFICACIA QUE  
SUS OLIVOS  
SE MERECE**

**CERTIS**  
Growing Together

**KDOS®**

Fungicida para el control de diferentes enfermedades en cítricos, olivar, frutales de hueso y pepita, y hortícolas

PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. REGISTRO NÚM. 22.002.  
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

# KDOS®

El cobre con mayor biodisponibilidad y eficacia.  
Fungicida formulado como microgránulos dispersables (WG)  
para proteger tus cultivos.



### MÁXIMA EFICACIA

Alta eficacia frente a repilo por su mayor liberación de cobre activo.



### CALIDAD

Formulación en microgránulos dispersables (WG) que permite una buena persistencia, cobertura y adherencia. Mayor resistencia al lavado.



### RESPETUOSO

Buena selectividad en olivar. Reduce el cobre metal por unidad de superficie entre el 20 y el 65%.

## CARACTERÍSTICAS

**KDOS®** contiene un 35% de hidróxido cúprico y está formulado como microgránulo dispersable (WG).

**KDOS®** actúa de forma preventiva sobre la germinación de las esporas y desarrollo inicial del micelio y está registrado en Agricultura Ecológica y como insumo por FIBL, pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Demeter.

## USOS AUTORIZADOS EN CULTIVOS LEÑOSOS Y HORTÍCOLAS

Cultivo	Enfermedades	Dosis máx. (g/hL)	PS (días)	Observaciones
Olivo	Repilo	200-250	14	Aplicar todos los estadios. Máximo 3 aplicaciones y 6 kg/ha/año
Cítricos	Aguado y gomosis	150-200	21	Aplicar desde cuajado hasta fruto maduro. Máximo 3 aplicaciones y 6 kg/ha/año
Tomate, berenjena	Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis	150-200	Aire libre: 3 Invernadero: 7	Aire libre e invernadero. Aplicar desde 9 hojas tallo principal hasta madurez completa. Máximo 5 aplicaciones y 11,4 kg/ha/año Aire libre e invernadero.
Melón, calabacín, pepino	Alternaria, antracnosis y bacteriosis	200-250	3	Aplicar desde 5ª hoja verdadera tallo principal hasta madurez completa. Máximo 4 aplicaciones y 11,4 kg/ha/año
Lechuga	Alternaria, antracnosis, bacteriosis	150-200	15	Aire libre. Máximo 5 aplicaciones
Frutal de hueso	Abolladura, bacteriosis, cribado y monilia	200-250	90	Aplicar hasta fin de la floración. Máximo hasta 3 aplicaciones y 4,3 kg/ha/año
Frutal de pepita	Bacteriosis, monilia y moteado	200-250	NP*	Aplicar hasta fin de la floración. Máximo hasta 3 aplicaciones y 4,3 kg/ha/año

NP\*: No presenta.