EL OXICLORURO
DE COBRE
QUE LE OFRECE
LA CALIDAD
Y EFICACIA QUE
SU VIÑA SE MERECE

CERTIS
Growing Together

CUPROZIN® 35

Fungicida para el control de diferentes enfermedades en cítricos, manzano, melocotonero, tomate y vid

PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. REGISTRO NÚM. ES-00858.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

CUPROZIN® 35

El oxicloruro de cobre con mayor adherencia. Resistencia a la lluvia y eficacia duradera.

Fungicida formulado para proteger a cultivos de cítricos, manzano, melocotonero, tomate y vid de diferentes enfermedades.

MÁXIMA EFICACIA
Alta eficacia frente a mildiu de la vid por las excelentes propiedades fisicoquímicas y técnicas.

CALIDAD
Formulación en forma de polvo mojable (WP) que permite una rápida humectabilidad, suspensibilidad y adherencia. Alta resistencia al lavado.

RESPETUOSO
Buena selectividad en viña. Compatible con los fungicidas, insecticidas y acaricidas más comunes.

CUPROZIN® 35

CUPROZIN® 35 está compuesto por 35% de oxicloruro de cobre y está fabricado por Spiess Urania (conocido internacionalmente por ser productor y proveedor de productos químicos de cobre). **CUPROZIN® 35** actúa de forma preventiva sobre la germinación de las esporas y desarrollo inicial del micelio de las enfermedades.

RECOMENDACIONES DE USO

CUPROZIN® 35 deberá ser aplicado en pulverización foliar y en plan preventivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Cultivos / Enfermedades	Dosis (Kg/ha)	Volumen Caldo (L/ha)	P.S. (días)	Observaciones
Cítricos (excepto limonero) *(Phytopthora spp.)*	2,8	1000	14	Aplicar desde que el fruto empieza a colorear hasta fruto maduro. Máximo 1 aplicación.
Limonero *(Phytophthora spp.)*	2,8	1000	14	Aplicar desde que el fruto empieza a colorear hasta fruto maduro. Máximo 2 aplicaciones con intervalo de 10 días.
Manzano (Moteado)	1,4 - 2,2	850-1200	21	Aplicar desde el BBCH 71 hasta 21días antes de la recolección: 2,2 Kg/ha (máx. dos aplicaciones por campaña). 1,4 Kg/ha (máx. cuatro aplicaciones por campaña).
Melocotonero (Abolladura)	1,54 - 3,57	1000	NP	Aplicar desde letargo a fin de hinchado de yemas. De 1 a 3 aplicaciones con un intervalo de 7 días entre las mismas. Dependiendo de la gravedad de la infección se elegirá la dosis de aplicación: 3,57 Kg/ha (máx. una aplicación por campaña). 2,14 Kg/ha (máx. dos aplicaciones por campaña). 1,54 Kg/ha (máx. tres aplicaciones por campaña).
Tomate *(Phytophthora infestans)*	1,72 - 2	800	3	Desde el primer brote lateral primario hasta 3 días antes de la recolección. Máximo 5 aplicaciones con intervalo de 10 días.
Vid (Mildiu)	2,2	1000	21	Desde cuajado de frutos a ablandamiento de las bayas. Máximo 1 aplicación.

P.S.: Plazo de seguridad.