

CERCOBIN® 50 SC

Fungicida sistémico preventivo y curativo

Nº de Registro: 16.853

Composición: Metil tiofanato 50% p/v

Formulación: Suspensión concentrada (SC)

Tipo de envase: Botella de 1 L y garrafa de 5 L

CARACTERÍSTICAS

CERCOBIN® 50 SC es un fungicida polivalente con actividad preventiva y curativa, que pertenece a la familia de los bencimidazoles y actúa por vía sistémica y por contacto. Está formulado a base de Metil tiofanato y posee un amplio espectro de acción, resulta efectivo frente a botritis, oídio, *Fusarium*, cribado, moteado, royas, antracnosis, cladosporiosis y otras enfermedades. No usar en combinación con otros productos.

CULTIVO / ESPECIE	ENFERMEDAD	DOSIS	P.S. (días)	NOTAS
Trigo, cebada, avena, centeno, triticale	<i>Fusarium</i> , Oídio	0,1%-0,15%	42	Aplicar en pulverización un máximo de 1.15 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Vid de vinificación	Botritis, Oídio	0,1%-0,15%	35	Aplicar un máximo de 0.5 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Melocotonero, nectarino y albaricoquero	Cribado, Monilia, Oídio	0,1%	3	Aplicar un máximo de 1.2 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Ciruelo	Monilia, Oídio	0,1%	14	Aplicar un máximo de 1.33 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Cerezo	Monilia	0,1%	14	Aplicar un máximo de 1.33 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Manzano	Monilia, Moteado, Oídio	0,1%	3	Aplicar un máximo de 1.2 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Peral	Monilia, Moteado, Oídio, Septoria	0,1%	3	Aplicar un máximo de 1.2 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Tomate y berenjena.	Antracnosis, Botritis, <i>Fusarium</i> , Oídio, Septoria	0,1%-0,15%	3	Aplicar un máximo de 1.4 L/ha al aire libre y 0.35 L/ha en invernadero. Realizar una sola aplicación.
Melón, sandía y calabaza.	Antracnosis, Botritis, Cladosporiosis, <i>Fusarium</i> , Oídio	0,1%-0,15%	3	En sandía y calabaza contra <i>Fusarium</i> aplicar sólo en invernadero mediante pulverización de un máximo de 0,35 L/ha en el caso de calabaza y un máximo de 1,4 L/ha en el caso de sandía. Para los demás usos, aplicar un máximo de 1,4 L/ha al aire libre e invernadero. Realizar una única aplicación. En aplicaciones mediante riego por goteo la dosis máxima acumulada deberá ser de 4.5 L/ha.
Judías y guisantes para grano.	Antracnosis, Roya	0,1%-0,15%	28	Aplicar en pulverización foliar a la dosis máxima de 1.2 L/ha al aire libre, realizar una sola aplicación.
Ornamentales herbáceas	Antracnosis, Botritis, <i>Fusarium</i> , Oídio	0,1%-0,15%	NP*	Aplicar un máximo de 1.4 L/ha. Realizar una sola aplicación.
Ornamentales leñosas	Antracnosis, Botritis, <i>Fusarium</i> , Oídio	0,1%-0,15%	NP*	Aplicar un máximo de 1.4 L/ha al aire libre y de 0.35 L/ha en invernadero. Realizar una sola aplicación.

*No Procede.

