

NUEVO

CYFLAMID® 50 EW

El punto firme contra el óidio

N° de Registro: 25.461

Composición: Ciflufenamida 5.13% p/v

Formulación: Emulsión aceite en agua (EW)

Tipo de envase: Botellas de 1 L y garrafas de 5 L

CARACTERÍSTICAS

CYFLAMID® 50 EW es un fungicida de actividad preventiva y elevada persistencia en el control de óidio en diversos cultivos. Actúa por contacto con acción translaminar y un potente efecto vapor, que distribuye más uniformemente el producto, asegurando una mejor protección de la hoja y frutos.

Entre sus principales características destacan:

- Presenta actividad por contacto.
- Posee efecto translaminar.
- Potente acción vapor.
- Resistencia al lavado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

CYFLAMID® 50 EW debe ser aplicado con carácter preventivo antes de la aparición de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma. Su modo de acción actúa sobre diversos estados de crecimiento del hongo:

- Inhibe el crecimiento del micelio.
- Inhibe la formación de haustorios.
- Inhibe la diferenciación de las esporas (esporulación o producción del inóculo).

CULTIVO /ESPECIE	PLAGA/EFECTO	DOSIS	P.S. (días)	VOLUMEN CALDO (L/ha)	NOTAS
Frutal de hueso (melocotonero, nectarino, cerezo, ciruelo, albaricoquero)	Óidio	0,5 L/ha	14	400-1600	Aplicar con tractor o manualmente, dejando un intervalo mínimo de 7 días entre ambas aplicaciones. En albaricoquero y cerezo, tratar hasta el final de la floración (sin fruto en el árbol). En ciruelo tratar hasta el endurecimiento del hueso. Aconsejamos vigilar los riesgos de enfermedad cuando las condiciones de temperatura estén entre 18-22° C y humedades relativas superiores al 70%.
Frutal de pepita (manzano, peral, membrillero)					
Vid y Parrales de vid	Óidio	0,5 L/ha	21	400-1600	Aplicar con tractor o manual. Las aplicaciones pueden realizarse desde la apertura de las yemas hasta que todas las bayas de un racimo se tocan, con un intervalo mínimo entre ambas de 14 días. Aconsejamos vigilar las posibilidades de enfermedad en los momentos sensibles al ataque, en años normales, en racimos visibles (BBCH 53), al comienzo de la floración (BBCH 61) y con granos tamaño guisante.
Cereales	Óidio	0,5 L/ha	60	200-400	Aplicar con tractor durante la fase de ahijado. Si las condiciones meteorológicas y del cultivo lo aconsejasen, puede realizarse una segunda aplicación en la fase de espigado de la planta (para proteger la hoja bandera), dejando un intervalo mínimo de 28 días entre las aplicaciones.

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña en todos los cultivos mencionados.