



**LIMPIA
DE MILDIU**
DE DENTRO
A FUERA

CERTIS

MIXER®

Fungicida para control
del mildiu en vid y patata.



certiseurope.es

PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. REGISTRO NÚM. ES-00072.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO

MIXER®

Fungicida con acción preventiva, curativa y antiesporulante sobre el mildiu de la vid y de la patata.



COMPLETO

Impide el desarrollo del hongo en todas sus fases: germinación, crecimiento de hifas, desarrollo de esporangióforos y de oosporas.



STOPANTE

Al evitar la formación de nuevas esporas, se evita la difusión del mildiu de unas plantas a otras.



FLEXIBLE

Puede mezclarse con otros fungicidas que complementen la acción sobre otras enfermedades de la vid o la patata.

MIXER®

Composición:

Dimetomorf 50% p/v (SC).

Acción en la planta:

MIXER® es absorbido en 1 o 2 horas, se mueve del haz al envés de la hoja y del centro hacia los bordes de la hoja (sistemía local).

Acción sobre el mildiu:

Es un fungicida muy específico de mildiu, que impide la formación de nuevas membranas celulares del hongo, y por lo tanto su crecimiento, desarrollo y propagación.

Gestión de resistencias:

Es conveniente aplicar MIXER® en mezcla con productos de contacto con acción preventiva y con actividad complementaria sobre otras enfermedades de la vid o la patata que puedan presentarse al mismo tiempo que el mildiu.

Se recomienda alternar con productos anti-mildiu con distinto modo de acción.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

MIXER® debe aplicarse preferentemente de forma preventiva cuando se den las condiciones de desarrollo del mildiu.

| | Mildiu de la Patata (<i>Phytophthora infestans</i>) | Mildiu de la Vid (<i>Plasmopara viticola</i>) |
|--|---|---|
| Dosis | 300-360 mL/ha | 300-340 mL/ha |
| Volumen de caldo | 100-400 L/ha | 100-1000 L/ha |
| Momento de aplicación | De 1ª hoja desplegada hasta fin de tuberización | De inflorescencias visibles a bayas del racimo tocándose |
| Núm. máximo de tratamientos | 5 tratamientos | 1 tratamiento |
| Intervalo de aplicaciones y alternancia de productos | Cada 7 días. Se recomienda alternar con productos de distinto modo de acción | Usar otro producto de distinto modo de acción a los 7-10 días |
| Plazo de seguridad a cosecha | 7 días | 28 días |
| Mezclas recomendadas | <ul style="list-style-type: none">• Mancozeb (complemento para alternaria)• Cobre (al final del ciclo) | <ul style="list-style-type: none">• Folpet (complemento botritis)• Mancozeb (complemento black rot)• Cobre (al final del ciclo) |